



Figuroa Alcorta 7285-Buenos Aires

|             |                  |        |                           |       |           |           |        |
|-------------|------------------|--------|---------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Propietario | Dr Scipioni Hugo | Animal | equino hembra , polo, FCV | FECHA | 04-May-15 | PROTOCOLO | 124456 |
|             | Veterinario      |        |                           |       |           |           |        |

## INFORME DE NECROPSIA

### Historia, síntomas diagnóstico clínico y tratamientos

presenta síndrome de dolor abdominal , intenso dolor, transpiración abundante, se echa .Parámetro incompatible se indica eutanasia

Índice de mortalidad:

Índice de morbilidad:

Ver historial clínico. Adjunto. ver tratamiento y diagnostico de laboratorio. En historia clínica.

### Resultados de pruebas de laboratorio previas :

ver historia clínica.

### Radiológicos/Ecog.

ECG:

FIJACIÓN

Horas sin fijar=48 hs en fr

Refriger: Temperatura

horas

5 hs

### HALLAZGOS DE NECROPSIA POR SISTEMAS

SLA =Sin lesiones aparentes

EXTERIOR

protrusion el utero y recto por ano

Mucosas

enrojecidas

Mucosas rojas.

Timpanismo abdominal.

### SISTEMA CIRCULATORIO

CORAZÓN

se observa imbibición por hemoglobina del endocardio. Las válvulas también enrojecidas por la misma  SLA

ARTERIAS

SLA

LINFÁTICOS

SLA

SANGRE

Coloración rojo oscuro.

SLA

### SISTEMA RESPIRATORIO

CAVIDAD NASAL

SLA

SLA

Tráquea

Mucosa con imbibición por hemoglobina color rosado. Congestivos.

SLA

Se observa color rosado de la mucosa del órgano,

SLA

PULMONES

Cuadro congestivo en ambos pulmones correspondientes al shock antemortem, petequias en la pleura  SLA

BRONQUIOS

### SISTEMA HEMATOPOYÉTICO

BAZO

Aspecto congestivo

SLA

### SISTEMA LOCOMOTOR SLA

### SISTEMA URINARIO

RIÑONES

Derecho

consistencia normal, no se observan grandes cambios antemortem.

SLA

Cambios post mortem, característicos del tiempo transcurrido. DII

Izquierdo

congestion en corteza shock

URÉTERES

SLA

VEJIGA

poco contenido de orina.

SLA

URETRA

SLA

### APARATO DIGESTIVO

BOCA

mucosa rojo oscuro

SLA

FARINGE

SLA

ESTOMAGO

presenta una zona de desgarramiento de la pared ( ruptura ) en la porción posterior superior izquierda  SLA

|                          |  |                          |                    |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------|
|                          | la exterior . Contenido de pasto con presencia de semillas de aspecto redondo , plano de 0,4 a 0,6 cm de radio | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| INTESTINO DELGADO        | Duodeno contenido liquido amarillo verdoso, olor fuerte .  | <input type="checkbox"/> | SLA                |
|                          | Yeyuno enteritis catarral con contenido bilioso liquido  | <input type="checkbox"/> | SLA                |
|                          | Íleon serosa peritoneal con fibrina en superficie. Igual que el colon mayor.                                   | <input type="checkbox"/> | SLA                |
|                          | Ciego contenido liquido amarillo verdoso, olor fuerte  | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| INTESTINO GRUESO         | Colon peritonitis fibrinosa incipiente , contenido con pasto y semillas antes descritas.                       | <input type="checkbox"/> | SLA                |
|                          | Áreas de compactación provenientes del íleo paralítico previo a la muerte.                                     | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| RECTO                    |  |                          |                    |
| HÍGADO                   | Congestion Peri hepatitis en la zona donde se adherida el contenido gástrico en la zona dorsal. Izquierda.     |                          |                    |
| PÁNCREAS                 | Enrojecido, contenido del estómago pegado al órgano.   | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| <b>SISTEMA ENDOCRINO</b> |  |                          |                    |
| GENITALES                | Útero sin contenido pero agrandado por la preñez perdida.  | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| Externos                 |  | Gland Mama:              | Mastitis purulenta |
| <b>SISTEMA NERVIOSO</b>  |  |                          |                    |
| CEREBRO                  | SLA  | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| CEREBELO                 |  | <input type="checkbox"/> | SLA                |
| MÉDULA ESPINAL           |  | <input type="checkbox"/> | SLA                |

**MUESTRAS EXTRAÍDAS DURANTE LA NECROPSIA**

hpt: Estomago, Duodeno , hígado, riñón, bazo, pulmón, hígado.

**DIAGNOSTICO DE NECROPSIA**

(PREVIO AL RESULTADO DE LAS MUESTRAS)

La causa del estado de abdomen agudo fue ruptura de pared del estómago, peritonitis incipiente, e íleo paralítico.

**Dr. Gerardo J Larotonda**  
M Vet Patólogo  
MP 2901



